

THESIS

MUNICH

1966

DIE VERKÜRZUNGSOSTEOTOMIE
AN DEN UNTEREN EXTREMITÄTEN

Wolfgang Gernet

LANE MEDICAL LIBRARY
STANFORD UNIVERSITY
300 PASTEUR DRIVE
PALO ALTO, CALIF.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

AUS DER ORTHOPÄDISCHEN KLINIK DER UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Direktor: Professor Dr. M. Lange

DIE VERKÜRZUNGSOSTEOTOMIE
AN DEN UNTEREN EXTREMITÄTEN

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde in der gesamten Medizin
verfaßt und
einer Hohen Medizinischen Fakultät
der Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von
Wolfgang Gernet
aus München

München 1966

Mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät
der Universität München

Berichterstatter: Prof. Dr. M. Lange
Mitberichterstatter: Privatdozent Dr. K. Viernstein
Dekan: Prof. Dr. M. Kiese
Tag der mündlichen Prüfung: 20.12.1966

Meinen Eltern
in Dankbarkeit gewidmet

INHALTSVERZEICHNIS

A) EINLEITUNG

B) I Theoretischer Teil

1. Ursachen der Beinverkürzungen
2. Operationsmethoden zur Beseitigung größerer Beinlängenunterschiede vor der Marknagelung
 - a- Verlängerungsosteotomie
 - b- Verkürzungsosteotomie
 - c- Epiphysiodese
 - d- Diskussion
3. Die Methode der Verkürzungsosteotomie mit Hilfe der Marknagelung nach KÜNTSCHER
 - a- Bedingungen
 - b- Operationstechnik
 - c- Diskussion
4. Nachbehandlung

B) II Statistischer Teil

1. Anamnesen
2. Bildmaterial

C) ERGEBNISSE und DISKUSSION

D) ZUSAMMENFASSUNG

E) LITERATURVERZEICHNIS

A) EINLEITUNG

"Während für die Funktion der oberen Gliedmaßen eine Asymmetrie der äußeren Umfänge von keiner oder jedenfalls von untergeordneter Bedeutung ist, wirken sich infolge der Hauptaufgabe des Beines, als Stütze zu dienen, schon geringe Verschiedenheiten der Beinlängen in einer Behinderung der Funktion aus. Gleichmäßiger Gang und Stand setzen gleiche Beinlängen voraus. Geringe Verkürzungen bis 3 cm können noch durch Beckensenkung ausgeglichen werden, und nach einiger Zeit der Gewöhnung weist allein die während des Gehens und Stehens auftretende und ausgleichende Verbiegung der Wirbelsäule auf die Verkürzung hin. Ist die Verkürzung erheblich, so wird eine Unterlage unter die Fußsohle zum Ausgleich notwendig" (v. Lanz - W. Wachsmuth).

Schuhe und Apparate bleiben aber immer nur Ersatzmittel. Durch solche Hilfsvorrichtungen, die entsprechend den Verhältnissen der Tragkraft und Schwere des Materials gearbeitet von der an sich schon stark geschädigten Extremität getragen werden müssen, treten besonders bei jüngeren Patienten oft seelische Komplexe auf. Zu berücksichtigen ist auch die möglicherweise auftretende Behinderung im späteren Berufsleben, in der Sportausübung, wie auch die Verringerung der Heiratsaussichten für Mädchen. Das Ziel einer orthopädischen Therapie ist deshalb der Ausgleich der Beinlängendifferenz, die Begradigung, Stabilisierung der Statik und die Erhaltung und Wiederherstellung der Beweglichkeit. Dieses Ziel kann erreicht werden durch die seit einigen Jahren durchgeführte Verkürzungsosteotomie mit Hilfe der Küntscher-Nagelung. Diese Operation, die einen großen Eingriff und eine nicht minder große Belastung für den Patienten darstellt, beabsichtigt aber niemals nur

einen kosmetischen Erfolg, sondern sie ist indiziert wegen der sekundären, teils schweren Veränderungen des Beckens, der Wirbelsäule, des Brustkorbs, und wegen der Erhaltung der Kniefunktion am gesunden Bein. MAX LANGE weist darauf hin, daß sich bei größeren Längenunterschieden der Beine ein genu recurvatum der gesunden Seite entwickeln kann.

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um die statistische Erfassung und Auswertung der Ergebnisse sowie um Nachuntersuchungen der seit 1955 in der Orthopädischen Klinik München durchgeführten Verkürzungsosteotomien.

B) I THEORETISCHER TEIL

1. Ursachen der Beinverkürzungen

Folgende Krankheitsbilder ziehen Beinverkürzungen nach sich:

- a) Längenwachstumsstörungen infolge Schädigung der Epiphysenfugen (tuberkulöse Prozesse, Osteomyeliten, septische Gelenksentzündungen, Bestrahlungsschäden oder Tumoren)
- b) Poliomyelitis
- c) Angeborene Hüftluxationen 3. Grades
- d) Fehlstellung geheilter Knochenfrakturen
- e) Angeborene oder erworbene Verkrümmungen der langen Röhrenknochen (X- und O-Bein)

f) Traumatische Schädigungen

ad c): Weniger die Normalisierung der statischen Verhältnisse als die Einrenkung der luxierten Hüfte veranlassen hier die frühzeitige Operation. Frühzeitig deswegen, weil die Voraussetzungen für das funktionelle Einspielen von Kopf und Pfanne, auch bei schlechter Ausbildung derselben, im Wachstum noch am günstigsten sind. Hier hat die Verkürzung nicht den Sinn, die Beinlängendifferenz auszugleichen, sondern sie ist ausschließlich deshalb erforderlich, um den hochstehenden Hüftkopf ohne zu starke Muskelspannung in die Pfanne ziehen zu können.

Die aus diesen Krankheitsbildern resultierenden sekundären Veränderungen des Bewegungsapparates sind Indikationen zu einer Verkürzungsoperation, die sich die Normalisierung der statischen Verhältnisse zum Ziel gesetzt hat. Die Operation soll möglichst frühzeitig vorgenommen werden, bevor sich sekundäre Veränderungen des Bewegungsapparates wie z.B. Skoliosen, Bewegungseinschränkung in den Gelenken u.ä. einstellen. Außerdem läßt sich die Wirbelsäule bei älteren Patienten mit schon lange bestehenden Skoliosen meistens nicht mehr aufrichten.

2. Operationsmethoden zur Beseitigung größerer Beinlängenunterschiede vor der Marknagelung

Das Problem, einen Ausgleich zwischen verschiedenen langen Beinen herbeizuführen, beschäftigt die Orthopäden schon lange.

Vor der Einführung der Marknagelung gab es mehrere Möglichkeiten zur operativen Beseitigung größerer Beinlängendifferenzen.

a) Verlängerungsosteotomie

- Schiefe Osteotomie des Femurs oder der Tibia mit nachfolgender starker Gewichtsextension (SCHEDE),
- Schiefe Osteotomie der Tibia und der Fibula mit nachfolgendem Gipsverband, der von der Basis der Zehen bis zum tuber ossis ischii reichen soll.
Nach VON EISELSBERG wird er an der Osteotomie-
stelle circular durchtrennt und durch eine an beiden Seiten in den Spalt eingesetzte Extensions-
vorrichtung mit elastischem Zug werden die Gips-
ränder allmählich voneinander entfernt.

Problematisch bei dieser Methode bleibt die Verlängerung der Muskulatur, ebenso der Fascien, Nerven und Gefäße, wobei besonders Nerven und Gefäße auf eine stärkere Dehnung sehr empfindlich reagieren können. Ein weiteres Problem für den Patienten ist die monatelange Liegezeit im Gips mit starker Gewichtsextension. Dabei bleiben Gelenkkontrakturen sehr häufig zurück.

b) Verkürzungsosteotomie

- HOWORTH gab 1942 einen Überblick über dieses Thema. Das Verdienst, die erste Verkürzungsosteotomie ausgeführt zu haben, gebührt nach DEUTSCHLÄNDER wahrscheinlich HEINE. 1847 führte RIZZOLI eine Verkürzungsosteotomie am Oberschenkel aus. Nach schräger Osteotomie erfolgte eine Verschiebung

der Knochenenden soweit aneinander vorbei, bis die Verkürzung ausgeglichen war. HOFFA, MAYER und SAYRE verwendeten ebenfalls diese Methode. 1907 verwendete DEUTSCHLÄNDER zur Fixation der Knochenenden Aluminiumplatten und Schrauben. TAYLOR berichtet 1916 von Tierexperimenten, bei denen die Verkürzung mit nutenförmiger Verzahnung und Fixation mit Lane'schen Platten und Nägeln vorgenommen wurden. FASSETT verwendete 1918 ebenfalls Lane'sche Platten. ROYLE berichtete 1923 von 4 Fällen, bei denen Nägel und Lane'sche Platten angewandt wurden. 1918 beschrieb CALVÉ drei Methoden zur Fixierung der Osteotomie mit zapfenförmiger Osteotomie. Weitere Erfahrungen mit dieser Methode berichten 1931 GROVES und 1933 MOORE und CAMERA. HOWORTH berichtet von Erfahrungen bei Verkürzungsosteotomien am Femur von 1928-1940, bei denen stufenförmige Osteotomie und intramedulläre Knochen-spananlagerung durchgeführt wurden. Gute Ergebnisse seien aber erst mit Platten- und Schraubenfixation erzielt worden. WHITE berichtet 1935 und 1944 von Verkürzungsosteotomien mit schräger Osteotomie. M.D. MOORE beschrieb 1947 fünfzehn Fälle, bei denen eine supracondyläre, quere Osteotomie, Spananlagerung, sowohl in der Markhöhle als auch außen und Fixierung der Späne mit 2 Nägeln verwendet wurden. Größere Verkürzungen konnten aber mit dieser Methode nicht erzielt werden.

c) Epiphysiodese

Bei der temporären Epiphysiodese nach BLOUNT und der permanenten Epiphysiodese nach PHRMISTER ist besonders das richtige Einschätzen des Alters, d.h. des noch zu erwartenden Wachstums wichtig. Nach Ansicht MERCKELBACHS

ist die Epiphysiodese allein als vorbereitende Operation bei Jugendlichen im Alter von 12-14 Jahren angebracht. Nach schlechten Erfahrungen ist A.N. WITT mit der Epiphysiodese zurückhaltend und gebraucht sie nur zur "Steuerung von schweren Fehlstellungen, wie X- und O-Bein."

d) Diskussion

Man hat also versucht, entweder den Oberschenkel des kranken Beines zu verlängern oder den gesunden Oberschenkel zu verkürzen. Die Verlängerung des erkrankten Beines hat häufig zu völligen Mißerfolgen geführt (L. BÖHLER). Der starke Zug auf die in den meisten Fällen schon stark atrophiierte Muskulatur wirkte sich oft so ungünstig aus, daß es zu verzögerter Callusbildung und zu Pseudoarthrosen kam. Dazu kommt noch die Dehnung des Gefäßnervenstranges, die, wie schon unter a) angeführt, weitere Komplikationen herbeiführen kann. Die Verlängerung am Unterschenkel hält A.N. WITT für ungünstig, da sich die Gefahr der Thrombosenbildung vergrößert und die Neigung zu Callusverzögerungen, Pseudoarthrosen, Ischämien mit Gefährdung des Fußes im erweiterten Maße bestehen soll.

Die Verkürzung des gesunden Beines ist mit den unter b) und c) genannten Methoden wenig erfolgreich gewesen. Man entschloß sich hierzu selten wegen der technischen Schwierigkeiten, die in der sicheren Fixierung bestanden. Die Fragmente mit Nägeln oder mit Draht zu fixieren, war schwierig und brachte zweifelhafte Ergebnisse (OMBREDANNE, ZAHRADNICEK). Gegen die Verkürzung am Unterschenkel spricht, daß man zu wenig reseziieren kann. Die straff über der Tibia gespannte Haut muß bei einem solchen Eingriff stark erschlaffen. Ebenso ist eine

Beeinträchtigung der Fußbeweglichkeit zu befürchten. Trotzdem ist diese Möglichkeit bei zu starker Unterschenkelverkürzung der einen Seite zu erwägen, da sonst die Knie auf zu ungleiche Höhen zu stehen kämen (siehe Seite XI, Fall 42).

3. Die Methode der Verkürzungsosteotomie mit Hilfe der Marknagelung nach KÜNTSCHER

Obengenannte Operationen zum Ausgleich von starken Beinlängendifferenzen wurden überwiegend vor der Marknagelung angewandt. Die Marknagelung nach KÜNTSCHER hat alle bisher dagewesenen Verfahren vereinfacht, sicherer gemacht und ist jetzt das Verfahren der Wahl für die Verkürzungsosteotomie geworden.

a) Zur erfolgreichen Durchführung dieser Operationstechnik stellt KÜNTSCHER folgende Bedingungen:

- a₁ - Der Nagel muß ausreichend biegefest sein und in möglichst weiter Ausdehnung an der Innenwand des Knochens anliegen, um die Forderung nach einer "stabilen Osteosynthese" zu erfüllen,
- a₂ - Der Knochen muß ausreichend fest sein,
- a₃ - Es muß Formschlüssigkeit zwischen Knochen und Nagel bestehen.

b) Die Operationstechnik

Im Gegensatz zu der operativen Behandlung von Frakturen mit Nagelung verwendet man bei Verkürzungsosteotomien die Technik der offenen Marknagelung. Der Arbeitsgang

stellt sich folgendermaßen dar:

b₁ - Bestimmung der anzustrebenden Verkürzung

Die Länge beider Beine wird genau ausgemessen.

b₂ - Bestimmung der Lage des zu resezierenden Knochen-
stückes

Das zu entfernende Stück wird unter Röntgenkontrolle so ausgewählt, daß die zwei Stellen des Markraumes, die nach Resektion aufeinandergestellt werden, möglichst gleich weit sind. Denn, führt man die Resektion zu weit zentral durch, ist der Markraum des proximalen Oberschenkelstückes viel breiter als der des peripheren; wenn man zu weit peripher reseziert, ist das Gegenteil der Fall. Bedingung a₃ wäre in diesem Fall nicht erfüllt. Hiermit kommt man einer Gefährdung der Stabilität entgegen.

b₃ - Eröffnung der Markhöhle

b₄ - Entfernung des zu resezierenden Knochenstückes

Die Osteotomie selbst wird als Bohrosteotomie oder mit Hilfe der Giglisäge, mit einer elektrischen oder pneumatischen Säge durchgeführt. Nach L. BÖHLER wird noch eine Markierung der beiden Knochenstücke mit Hilfe eines Meißels vorgenommen, zum Schutz gegen eine primäre Rotation. Man kann linear, schräg oder Z-förmig osteotomieren. Um die beiden Bruchstücke gegen eine sekundäre Rotation zu sichern, ist jedoch, wie die Ergebnisse zeigten, eine V-förmige Verzahnung die sicherste Methode.

b₅ - Einschlagen des Marknagels
- - - - -

Erfahrungsgemäß gelingt es leicht, die beiden Oberschenkelstücke aufeinanderzustellen und den Nagel in die distale Markhöhle zu schlagen.

b₆ - Anlegen von Knochenspänen
- - - - -

Um der Gefahr einer verzögerten Callusbildung vorzubeugen, schlägt M. LANGE vor, nach einer Verkürzungscsteotomie die kombinierte Osteosynthese durchzuführen, d.h. Marknagelung und gleichzeitiges Anlegen von Knochenspänen. Dabei kann man das resezierte Knochenstück auseinandersägen und diese zwei Teile zu beiden Seiten der Operationsstelle als Phemisterspäne anlegen. "Den Knochenspan kann man auch aus der Tibia, aus dem Darmbeinkamm oder der Fibula entnehmen" (M. Lange).

b₇ - Anlegen eines Beckenbeingipses,
- - - - -

in dem der Patient möglichst früh belasten soll.

c) Diskussion

Der Marknagel erfüllt geradezu in idealer Weise die Forderung nach einer sicheren Fixierung der Knochenenden. Der Querschnitt des Nagels ist annähernd V-förmig, die Blechdicke am Rücken etwas geringer; dadurch können sich die beiden Schenkel des Nagels um so leichter nähern. Die Folge ist eine größere Querschnittselastizität. Es gibt verschieden große und dicke Nägel. Eine genaueste Auswahl des Nagels ist unbedingt erforderlich. Die Bedingungen beim Femur des Erwachsenen

sind denkbar günstig, denn er gleicht am ehesten einem Knochenrohr mit gleichbleibendem Durchmesser. Bei idealer Aufeinanderbringung der Knochenenden und sorgfältigster Wahl des Nagels ist die Marknagelung die sicherste Form, eine Formschlüssigkeit der beiden Bruchstücke zu erreichen.

Der Oberschenkel wird fest von der Fußsohle her ineinandergestaucht, so daß kein Spalt an der Osteotomiestelle bestehen bleibt. Die Muskelzugwirkung, die bei der normalen Marknagelung eine große Rolle für die Stabilität und Knochenneubildung spielt, und die die beiden Bruchstücke, neben der elastischen Verklemmung des Nagels, aneinander halten soll, ist nach der Verkürzungsosteotomie stark herabgesetzt.

Der im Markraum liegende Nagel wirkt nicht hemmend auf die Bildung jungen Knochengewebes. Die negativen Folgen einer monatelangen Ruhigstellung im Gips für die Muskulatur und die Gelenke existieren nicht. Die Muskulatur erschlafft anfangs, nach einigen Monaten jedoch ist eine ausreichende Schrumpfung mit Hilfe der Nachbehandlung eingetreten. In jedem Fall sollte noch eine medikamentöse Tonisierung der Muskulatur erprobt werden.

Obwohl die Marknagelung nach KUNTSCHER einen großen Erfolg für die Verkürzungsosteotomie darstellt, wurden doch von anderen Autoren Komplikationen beobachtet:

c₁ - Verzögerte Callusbildung

Bei den Heilungsvorgängen einer Osteotomie sind zwei Phasen von Wichtigkeit: die Entstehung des Callus und seine Entwicklung zur Knochenbrücke

oder im ungünstigsten Fall zur Pseudoarthrose. Der Callus wird durch eine Entzündung hervorgerufen. Der Entzündungsvorgang wird dabei hormonal gesteuert, Cortison hemmt, steigernd wirkt das Andosteron. Die Heilungstendenz hängt vom Grad und der Ausdehnung der Entzündung ab. "Der Entzündungsvorgang muß also an der Osteotomiestelle möglichst klein gehalten werden, damit keine zu große Menge an Callus entsteht, was wiederum eine weitreichende und starke Schädigung der umgebenden Weichteile zur Folge hat" (DANIS und DEJARDIN). Nach vorschriftsmäßiger Nagelung sind infolge der ausreichenden Stabilität des Nagels und der elastischen Verklemmung im Knochenmark Wackelbewegungen unmöglich. Wird jedoch ein zu dünner Nagel verwendet, so verbiegt er sich. Im Osteotomiebereich finden dann starke Bewegungen statt. Die Folge ist die Bildung gar keiner oder einer zu großen minderwertigen Callusmenge, und die Gefahr einer Pseudoarthrose ist damit gegeben. Auf Grund von Tierexperimenten nimmt KÜNTSCHER an, daß die Entzündung, die durch das Trauma der Osteotomie verursacht wird, genügt, die erforderliche Callusmenge hervorzurufen. Der Callus kann durch Zug-, Schub- und Scherkräfte zerrissen werden. "In den meisten Fällen aber gelingt es, die Osteotomie, wie auch die Pseudoarthrose, knöchern zur Heilung zu bringen, wenn eine stabilisierende Osteosynthese herzustellen ist" (KÜNTSCHER).

MAATZ beobachtete eine größere Zahl von Pseudoarthrosen, die nach Verkürzungsosteotomien auftraten, "was vermutlich auf eine mangelhafte Operationstechnik zurückzuführen ist". J. BOHLER stellte große, kugelförmige, tumorartige Callus-

bildungen - Reizcallus - fest, der dadurch entsteht, daß der Marknagel zu kurz oder zu dünn ist, und so die Knochenenden nicht absolut fixiert werden können. THOMPSON, STRAUB und CAMPBELL berichteten 1954 von 11 Fällen mit querer Osteotomie und KÜNTSCHER-nagelung, bei denen 12 Nachoperationen erforderlich waren wegen Pseudoarthrosen, genu recurvatum, schlechtem Sitz des Nagels, Verbiegung oder Bruch des Nagels. "Das Periost ist bei der Operation so weit als möglich zu schonen" (M. LANGE). Bei schlechter Beschaffenheit des Periosts soll man am Schluß der Knochennagelung einen kleinen Knochenspan in die Rinne über dem Bruchspalt einsetzen. Außerdem kann man nach dem Aufeinanderstellen der Osteotomie noch einige Male mit einem breiten Meißel quer über die Osteotomiestelle schlagen, was sich günstig auf die Callusbildung auswirkt.

c₂ - Fettembolie

Die Gefahr ist nach M. LANGE kaum nennenswert, wenn man die Markhöhle gut eröffnet und den Nagel langsam einschlägt. MAATZ hat im Tierversuch geringe Fetteinlagerungen in Lunge, Niere und Gehirn nach Osteotomien gefunden. Nach Ansicht J. BOHLERS sind leichte Fettaufschwemmungen bedeutungslos; "sie gewinnen erst dann Bedeutung, wenn die 'Toleranzgrenze' des Patienten erreicht ist". SENFF hat im Sektionsbefund zwei Fälle von Fettembolien bei Jugendlichen nachgewiesen. Nach M. LANGE neigen besonders Jugendliche nach Marknagelungen zu Fettaufschwemmungen, weshalb in solchen Fällen nach Möglichkeit Oberschenkelnagelungen vermieden werden sollten.

c₃ - Schockwirkung

M. LANGE vertritt die Ansicht, daß eine Schockwirkung nur bei Beinverlängerungsosteotomien eintreten kann. Genauere Untersuchungen hierüber wurden noch nicht durchgeführt.

c₄ - Blutbildveränderungen

Die Schädigungen des Knochenmarks als Bildungsstätte der roten und weißen Blutkörperchen durch die Marknagelung sind dieser Methode von verschiedenen Seiten entgegengehalten worden. KÜNTSCHER hatte bei seinen eigenen Versuchen und nach den ersten klinischen Erfahrungen keine nennenswerten schädigenden Folgen feststellen können. Erst RAISCH konstatierte eine erhebliche Anämie nach einer Marknagelung. SIANY berichtet nach systematischen Untersuchungen des Blutbildes im Verlauf von 15 Marknagelungen über angeblich z.T. starke Veränderungen. Diese Untersuchungen wurden von SOEUR und ROTH nachgeprüft, die zu weniger alarmierenden Ergebnissen kamen. Auch CANO-VALDES und MERKER konnten schwerwiegende Blutbildveränderungen nicht feststellen. Die Untersuchungen von RETTIG an Hand von 26 Marknagelungen und 17 anderen orthopädischen Eingriffen ergaben folgendes Bild:

der Anstieg der BKS war auffallend -

ein Hämoglobinsturz bis unter 50 wurde nur ausnahmsweise, unter 70 wiederholt beobachtet -

die Leuko-Werte bewegten sich in normalen Grenzen (ausgenommen die Infektionsfälle) -

Beobachtungen am Differenzialblutbild:

es wurde eine anfängliche Lymphocytose beobachtet, welche aber in zwei bis drei Wochen wieder zur Normalisierung führte. Eine Eosinophilie wie bei KÜNTSCHER wurde nicht beobachtet -

eine Vermehrung der Reticulocyten wurde festgestellt, wie sie auch SLANY berichtet hatte.

Ergebnis:

Durch das Trauma, welches das Knochenmark durch die Nagelung erleidet, kann sowohl das erythropoetische wie auch das leucopoetische System in Mitleidenschaft gezogen werden. Hierzu ist aber zu sagen, daß einmal nur in der Jugend das Knochenmark unter normalen Verhältnissen eine blutbildende Funktion ausübt und ferner diese im Vergleich zu den kleinen Knochen der Hand und der Fußwurzel, ebenso der Plattenknochen, wie der Scapula, Sternum usw., gering ist. MAATZ hält es damit für unwahrscheinlich, daß der Marknagel beim alten, ja auch beim Jugendlichen, sowohl bei der Eintreibung wie auch während der Liegezeit, als Reiz irgendwelche krankhaften Störungen im blutbildenden System hervorrufen kann. M. LANGE hält es ebenfalls auf Grund der Untersuchungen von RETTIG für nachgewiesen, daß die starke Erhöhung der BKS und der Absturz des Hb-Gehaltes nach einer Marknagelung keine spezifischen Erscheinungen dieser Methode sind. Vergleichsuntersuchungen von anderen großen Knochenoperationen, die ohne Marknagelung durchgeführt worden sind, zeigten in der gleichen Weise eine erhöhte BKS und ein Absinken des Hb-Gehaltes,

je nach Größe der Operation. Zu den gleichen Ergebnissen kam auch E. MAIER. "Trotzdem sollte die Marknagelung nur an gesunden, widerstandsfähigen Patienten durchgeführt werden" (M. LANGE).

c₅ - Infektionsgefahr

Von H. REICH sind Fälle von Infektionen nach einer Osteotomie in geringer Zahl, von MAATZ in größerer Zahl beschrieben worden. A.W. FISCHER, EHALT und STOTZ haben selbst tödlich verlaufende Fälle beobachtet. Laut L. BÖHLER ist die Gefahr einer Spätosteomyelitis nach einer Marknagelung ernst zu nehmen und die Häufigkeit des Auftretens einer solchen noch nicht zu überblicken. Mit der Marknagelung wird der ganze Markraum eröffnet, womit natürlicherweise die Gefahr einer ausgedehnten Infektion gegeben ist. Die Osteomyelitis beim Erwachsenen verläuft verhältnismäßig gut. Mit Hilfe einer Drainage soll für die gute Abflußmöglichkeit des eitrigen Sekrets gesorgt werden. Der Marknagel ist so lange zu belassen, bis eine ausreichende Festigkeit des Knochens eingetreten ist. KÜNTSCHER spricht sogar von Kunstfehler, wenn der Nagel vor Konsolidierung einer Osteotomiestelle, auch wenn sie infiziert ist, entfernt wird. Von großer Wichtigkeit ist auch die Ruhigstellung im Gipsverband. "Bei einer Verkürzungsosteotomie muß wegen der Infektionsgefahr immer unter Antibiotica-Schutz gearbeitet und für einwandfreie Operationsverhältnisse gesorgt werden" (M. LANGE).

4. Nachbehandlung

Ist genügend Stabilität und Callusbildung vorhanden, darf der Patient mit aktiven Bewegungsübungen für Hüft- und Kniegelenke beginnen; die Belastung soll so früh wie möglich erfolgen. Ist jedoch keine genügende Festigkeit erreicht, so wird der Patient mit Gipsstützen zum Aufstehen gebracht, damit der Belastungsdruck die Konsolidierung der Osteotomie fördern kann. Normalerweise ist die Osteotomie klinisch und röntgenologisch nach 2-3 Monaten fest. "Trotzdem soll der Nagel nicht vor Ablauf eines Jahres extrahiert werden" (M. LANGE).

Die krankengymnastische Nachbehandlung nach Entfernung des Gipsverbandes ist von größter Bedeutung und dauert meist einige Monate. Durch die Verkürzung des Knochens werden Muskeln und alle Weichteile des Oberschenkels relativ zu lang, was eine Schwächung des Beines zur Folge hat. Das aktive Strecken des Kniegelenks ist erschwert und es tritt vorübergehend eine verminderte Kniegelenkstabilität auf. Die Nachbehandlung hat deshalb die Kräftigung der Oberschenkelmuskulatur zum Ziel und erfolgt ausschließlich mit aktiven Übungen. Wie schon an anderer Stelle angeführt, ist auch hier wieder eine medikamentöse Tonisierung der Muskulatur zu überlegen!

B) II STATISTISCHER TEIL

Seit 1955 wurden in der Orthopädischen Klinik München 50 Verkürzungsosteotomien durchgeführt. In nachfolgenden Tabellen wurden alle diese Fälle statistisch erfaßt und ausgewertet.

Abkürzungen

WS	= pathologische Veränderungen an der Wirbelsäule
B und H	= pathologische Veränderungen an Becken und Hüfte
K	= Knie
Op.	= Operation
G-A.	= Gipsabnahme
Bwg.	= Beweglichkeit
Bel.	= Belastung
M-E.	= Marknagelextraktion
Rö	= röntgenologischer Befund
Sk	= Skoliose
B-sch	= Beckenschiefstand
K-schm.	= Kreuzschmerzen
Schm.	= Schmerzen
Ost.	= Osteotomie
re	= rechts
li	= links
angeb.	= angeboren
cm verk.	= das resezierte Knochenstück - in cm angegeben (Spalte 10)
V	= V-förmige Osteotomie
Z	= Z-förmige Osteotomie
schräg	= schräge Osteotomie

plan	= quere Osteotomie
subtrochantär	= subtrochantäre Osteotomie
Zahradniček	= Operation nach Zahradniček
Draht	= Drahtumschlingung
Span	= Spananlagerung

b.	Name Alter Geschl.	Diagnose	WS	B u. H	Extremi- täten	Beschwer- den	Fr C) t:
.	F.A. 19 J. w.	angeb. <u>Dysplasie</u> d. li. Femurs, Beinverkürzung a. U-schenkel li.	li-Sk. mit Rip- pentors.	keine	Klump- fuß li.	keine	3. su re th se
1.	P.A. 19 J. w.	mit 1 Jahr <u>Osteo- myelitis</u> re Fe.	li-Sk.	B-Sch	O-Bein re.	Schuh- ausgleich stört schmerz- frei	19 O- Os re
5.	G.A. 24 J. m.	angeb. <u>H-lux</u> , re. coxa vara re.	frei	H. re. 170° Beuge- kontrak- tur I.R.K.	frei	Schmerz i. re. H nach längerem Stehen	22 Va ru te re
4.	S.I. 20 J. w.	mit 6 J. <u>Polio</u> Beinverkürzung a. U-schenkel re.	frei	keine	Teilläh- mung d. re.Fußes	Gehbe- schwer- den	19 Sp fu ra re
5.	Sch.M. 23 J. w.	mit 7 J. <u>Osteo- myelitis</u> li.	frei	B-Sch	frei	K-schm Schm.re. Hüfte	Me Op on Os el
6.	W.E. 23 J. w.	mit 3 J. <u>Osteo- myelitis</u> li.	frei	keine	X-Bein li.	Keine	6. X- Os mi
7.	S.B. 20 J. w.	mit 1 J. <u>Polio</u> (re.Fe.verkürzt)	frei	B-sch	Arthro- dese im re.Talo- calcane- algel.	keine	3. su re th sa dy st

Diagnose- operationen	Bewegl.- keit i.K. praep.	Op-Dat. cm vor cm verk	G-A. nach ..Tg	Bwg. i.K. n.Op.	Bel. nach ..Tg	Entl. nach ..Tg	M-E. nach ..Tg	Wunde	Rö	Kompli- katio- nen
11.55 btala- Ar- rode- li.	frei	17.1.62 <u>5,5</u> 5 rechts Z-Draht	33	frei	76	88	490	pp.	fest	keine
7.60 Bein- teot.	frei	6.7.61 <u>14</u> 6 links V-Span	35	frei	47	61	485	pp.	fest	keine
12.60 lgisie- ngs- otomie	frei	6.2.61 <u>7</u> 6 links V-Span	51	180/ 100	63	95	668	pp.	fest	keine
55 itz- Bope- tion	frei	29.8.63 <u>2</u> 3 links V-Span	30	frei	-	88	-	pp.	fest	Lungen- infarkt
hrere erati- en wg. teomy- itis	frei	13.12.61 <u>8</u> 6 rechts V-Span	46	frei	56	64	305	pp.	fest	keine
6.62 Bein teoto- e li.	frei	23.7.62 <u>16</u> 7 rechts V	40	180/	64	88	-	pp.	fest	keine
8.58 btala- Ar- rodesse; upracon läre O- henkelst.	frei	21.7.58 <u>6</u> 5 links	41	frei	48	87	576	pp.	nach 1 J. fest	keine

r. bb.	Name Alter Geschl.	Diagnose	WS	B u. H	Extremi- täten	Beschwer- den	F. O t
8.	Z.M. 21 J. m.	mit 6 J. <u>Hüft- schuss</u> li.	keine	H-steife li.	Teilmus- kelläh- mung	Schm. in LWS	- su ch Ab os
9.	K.R. 18 J. w.	mit 4 J. <u>Polio</u> an beiden Bei- nen	keine	keine	X-Bein li. Klumpfuß re.	Schm. i. Gehappa- rat	8. La di 11 Re ar se
o.	L.R. 17 J. m.	als Kleinkind <u>Polio</u> re.	keine	keine	Spitz-, Knickfuß re; Teil- muskelpa- rese (tibia- lis a.+p., Quadriceps)	schm. frei	11 Ar se 18 zu se st
1.	K.E. 29 J. w.	<u>H-luxation</u> re.	Sk. d. LWS	B-sch	X-Bein re.	Schm. in li. Knie + li. H.	ke
2.	M.K. 46 J. m.	alte O- und U- schenkel <u>fraktur</u> <u>fehlstellung</u> li.	keine	Beuge- kontr. li. H. 180/90	Senk- Spreiz- fuß bei- derseits	schm.frei	ke
3.	M.G. 20 J. w.	<u>Epiphysenschädi- gung</u> nach Rönt- genbestrahlung re.	keine	keine	Genu val- gum re.	schm.frei	19 su cc re Be te
4.	B.O. 21 J. m.	<u>Osteomyelitis</u> li. (supracon- dylär)	keine	coxa valga luxans	frei	schm.frei	12 Va te

frühere Operationen	Bewegl.- keit i.K. praeop.	Op.-Dat. cm vor cm verk.	G-A. nach ..Tg.	Bwg. i.K. n.Op.	Bel. nach ..Tg.	Entl. nach ..Tg.	M-E. nach ..Tg.	Wunde	Rö	Kompli- katio- nen
btro- antäre dukt.- teotom.	frei	27.1.61 <u>7,5</u> 4 rechts Schräg-Sp.	81	frei	183	190	557	pp.	fest	keine
5.62 brinu- Fuß re. 7.62 sekt.- threde- re.K.	frei	30.8.62 <u>5,5</u> 3,5 rechts	47	frei	71	81	-	pp.	nach 1 J. nicht fest	Osteo- tomie nicht knöch. ver- heilt (2 Op.)
4.60 threde- re.F. 7.61 adriiceps anenpla- ik	frei	22.6.62 4 3 links V-Span	45	frei	60	120	-	pp.	fest	keine
line	frei	8.9.61 7 6 links V-Span	46	frei	56	64	44 Jahre	pp.	schl.	Stark verzöger- ter Heil- verlauf w.zu dün- nen Nagels
line	frei	1.10.58 <u>11</u> 6,5 rechts Schrägsp. draht	55	frei	80	80 (ohne Geneh- migg.)	-	pp.	fest	keine
56 pra- ndylä- O- inos- otomie	frei	16.12.63 <u>8</u> 6,5 links Schräg- Span	54	frei	38	72	-	pp.	fest	keine
10.52 r.-os- otomie	frei	30.10.59 <u>4,5</u> 3,5 rechts V-Span	125	frei	53	58	449	pp.	fest	keine

Nr.	Name Abb. Alter Geschl.	Diagnose	WS	B u. H	Extremi- täten	Beschwer- den	
15	A.I. 21 J. m	H-luxation 3.Gr. li. <u>Polio</u> li.	geringe Sk d.BWS + LWS	B-sch	Hakenfuß li.	schm.frei	1 3 1
16	B.P. 24 J. m.	nach früherer <u>O-schenkelfrak- tur</u> li. ist Un- fallbein länger geworden	Sk. LWS + BWS	B-sch	frei	K-schm., Schm li. H- u.Knie- gelenk	k
17	A.I. 27 J. w.	mit ca. 1 J. <u>Polio</u> li.	Sk.	H-dyspla- sie coxa val- gabds.	Teil- parese d. li. Beins	schm.frei	2 L n
18	F.M. 7 J. w.	angeb. <u>H-luxa- tion</u> 3. Gr. re.	keine	keine	frei	schm.frei	k
19	H.A. 16 J. w.	U-schenkel <u>Osteo- myelitis</u> li., postop. spast.	Total- Sk.	keine	Spitz- Klumpfuß li; K-gel. i. 160° verst.	schm.frei	2 s d t 2 S s
20	H.E. 28 J. w.	mit 6 J. <u>Coxitis</u> , <u>tbc</u> re.	Ausgl.- Sk.	H-steife re; B-sch; Beugekontr. re. H 135°	frei	schm.frei	6 s c O m
21	F.I. 22 J. w.	mit 5 J. distaler <u>Unterschenkel</u> durch- <u>schuß</u> re.	Ausgl. Sk. 	B-sch	Steife i. re. Knöchel	K-schm. Schm. im re.B.	k

Frühere Opera- tionen	Bewegl.- keit i.K. praeop.	Op.-Dat. cm vor cm verk.	G-A. nach ..Tg.	Bwg. i.K. n.Op	Bel. nach ..Tg.	Entl. nach ..Tg.	M-E. nach ..Tg.	Wunde	Rö	Kompli- katio- nen
3.8.63 chanz' che Op. i.	frei	17.10.63 <u>8</u> 5 rechts subtro- chantär. Laschennagel	38	180/ 85	49	53	501	pp.	fest	keine
eine	frei	25.7.63 <u>3</u> 3 links V-Span	25	frei	40 in Gips- hose	66	239	pp.	fest	keine
o.11.61 ambri- udi li.	frei	19.2.62 <u>6</u> 3 rechts Stuten- Span Draht	69	frei	100	90	439	pp.	ver- zö- gert	keine
eine	frei	12.12.63 <u>4</u> 2 rechts V-Zahrad- nicek	49	180/ 100	65	76	-	pp.	fest	keine
7.7.55 ipracon- yläre Os- eotomie; 3.1.62 toffel' che Op.	frei	20.2.62 <u>8</u> 3 1/2 rechts V-Span	44	180/ 90	52	54	-	pp.	fest	keine
.9.62 ibtro- antäre steoto- ie	frei	4.2.63 <u>11</u> 5 links V-Span	28	frei	46	61	341	pp.	fest	keine
eine	frei	25.5.62 <u>7</u> 5,5 links Stufen- Draht	39	frei	46	47	406	pp.	fest	keine

Nr.	Name Abb. Alter Geschl.	Diagnose	WS	B u. H.	Extremi- täten	Beschwer- den	
22	G.L. 18 J. w.	Verkürzung d. re. O-schenkels nach <u>Coxitis</u>	keine	keine	frei	schm.frei	1
23	H.W. 24 J. m	mit 7 J. <u>Straßen- bahnunfall</u> (Frak- tur li.Sprunggel. Beinverkürzung)	keine	keine	li.Sprung- gel.teil- versteift	Kr-schm Schm in li.H.	1
24	F.K. 7 J. w.	<u>H-luxation</u> 3. Gr. re.	keine	coxa valga luxans li.	frei	schm.frei	1 V r t l
25	K.G. 18 J. w.	mit 2 J. <u>Polio</u> li.	hohlrun- der Hal- tungsver- fall	B-sch	leichte Hakenf.- bildung; Teilläh- mung li. O-schenkel	Gehbe-	2 H c 1 n F
26	K.E. 27 J. w.	angeb. <u>H-dyspla- sie</u> li.	Sk	B-sch	Beweglich- keit in li. H. einge- schränkt	Kr-schm.	1 G o m
27	L.I. 17 J. w.	mit 3 J. <u>H-tbc</u> li	geringe Sk d.LWS	B-sch Ankylo- se i.li. H-gel.	frei	schm.frei	1 z b
28	M.F. 26 J. w.	mit 24 J. Unfall <u>O-schenkelfraktur</u> <u>fehlstellung</u>	keine	B-sch	Kniestei- fe re.	schm.frei	2 2 c n s

Frühere Opera- tionen	Bewegl.- kei i.K. praeop.	Op-Dat. cm vor cm verk.	G-A. nach ..Tg.	Bwg. i.K. n.Op.	Bel. nach ..Tg.	Entl. nach ..Tg.	M.-E.Wunde nach ..Tg.	Rö.	Kompli- katio- nen	
keine	frei	16.7.59 <u>7</u> 5,8 links Stufen- Draht	28	frei	30	38	615	pp.	etw. ver- zö- gert	keine
keine	frei	24.4.59 <u>6</u> 4 rechts Z	66	frei	76	81	440	pp.	fest	keine
9.5.60 varisie- rungsos- eotomie i.	frei	19.5.60 <u>2</u> 2 rechts V-Span	43	180/ 90	65	91	203	ei- ter- te	fest	ständige Fistel- eite- rungen
2.7.47 Akenfuß- p. li; 948 Seh- enver- flanzg.	frei	11.7.56 <u>2</u> 3,5 rechts V-Span	29	frei	34	57	346	pp.	fest	keine
947 Akelungs- steoto- ie	frei	14.6.61 <u>6</u> 4,5 rechts V-Span	39	180/ 70	49	76	-	pp.	fest	keine
957 wei O- einop.	frei	20.6.60 <u>6</u> 4 rechts V-Span	29	frei	39	64	495	pp.	fest	keine
6.9.55 quadri- epsseh- enpla- tik	frei	13.7.56 <u>7</u> 4 links plan-Span	56	180/ 90	100	246	439	ei- nach tert; 1 J. Fas- cien-fest nekro- se		Verzöge- rung dch. Eitern. schlechte Callus- bildung

Name Alter Geschl.	Diagnose	WS	B u. H	Extremi- täten	Beschwer- den	F. O. 1
H.I. 24 J. w.	angeb. <u>H-luxation</u> re.	leichte Sk d. LWS	B-sch; coxa valga re.	frei	schmfrei	19 Sc sc r. li. Va re
M.U. 23. J. w.	angeb. <u>H-luxation</u> bds.	Sk d. LWS + BWS mit Rotations- komponente	B-sch; H-steife re.	X-Bein re.	K-schm. Schm.im re. Knie	19 Ab 19 le 16 L-
P.G. 17 J. w.	angeb. <u>H-luxation</u> re.	keine	H. re. 180/110 Inn.rot. 0°	Knick- fuß li; Halux valgus bds.	schm.frei	19 HU bd
D.M. 7 J. w.	angeb. <u>H-luxation</u> bds.	keine	keine	frei	schm.frei	22 Ko va Ei ku
W.S. 18 J. m.	mit 1 1/2 J. Frak- tur li. - <u>Fraktur-</u> <u>fehlstellung</u>	großbogi- ge Sk	B-sch	X-Bein	schm.frei	19 X- os 19 X- 21
Sch.M. 16 J. w.	mit 6 J. <u>Osteomy-</u> <u>elitis</u> an beiden O-schenkeln	geringe Sk	B-sch; H-steife re.	frei	schm.frei	19 Se st te
F.J. 22 J. m.	angeb. <u>Dysplasie</u> d. re. Beins	Ausgleich- Sk d. LWS	B-sch	Spitzfuß re; genu varum + genu re- curvatum re.	bei länge- rem Gehen Schm.i.re. Fuß u. re. Bein	19

rühere perati- nen	Bewegl.- keit i.K. praeop.	Op.Dat. cm vor cm verk.	G-A. nach ..Tg.	Bwg. i.K. n.Op.	Bel. nach ..Tg.	Entl. nach ..Tg.	M-E. nach ..Tg.	Wunde	Rö	Kompli- katio- nen
51 nanz' ie Op. . 6.63 r.o-t .	frei	16.3.64 <u>8</u> 5,5 links V-Span	32	frei	40	54	-	pp.		Pseudoarthro- se! Mußte am 8.3.65 nach- operiert wer- den (Spananla- gerung). Es wur- de ein zu dün- ner Nagel ver- wendet!
.1.62 dukt-Ost; .5.62 ndel-Ost; .7.63 Bein-Ost	frei	29.7.63 <u>7</u> 5 links V-Span	41	180/ 90	50	69	339	pp.	fest	keine
58/59 ftop. s.	frei	23.2.62 <u>5,5</u> 5,5 links V-Span	78	frei	28 in Gips	86	410	pp.	fest	(Nachkor- rektur d. Oststelle) Nagel muß- te am 17. 5.62 nach- geschla- gen werd.
.8.52 nser- tive nren- ng	frei	19.5.58 <u>2</u> 2 links V- Zahradnicek	42	frei	62	42	398	pp.	fest	keine
49 Bein- teot. 52 Bein- teot.	frei	24.4.56 <u>8,5</u> 4,5 rechts V-Span	40	frei	18 in Gips	40	-	pp.	fest	keine
54 que- eros- ctomie	frei	27.9.62 <u>6</u> 5 links V-Span	40	180/ 80	48	60	664	pp.	fest	Nagel- bruch 15.7.63 Nagel- bruch- operat.
ine	frei	7.2.62 <u>4,5</u> 4 links V-Span	38	frei	45	59	399	pp.	fest	keine

Name Alter Geschl.	Diagnose	WS	B u. H	Extremitäten	Beschwerden	F C t
H.G. 22 J. w.	mit 12 J. <u>Coxitis</u> re.	Sk der LWS	B-sch; H-steife re.	X-Bein re.	Schm. in re. H.	20 su ch Os 29 X- re
H.H. 22 J. w.	<u>O-schenkelfraktur</u> <u>fehlstellung</u> nach Unfall mit 21 J.	keine	B-sch	Hallux valgus bds.	bei län- gerem Ge- hen Schm. i.re.Bein	20 Ko de tu
M.M. 28 J. w.	angeb. <u>H-luxation</u> li. (3.Grades)	Sk	B-sch	frei	K-schm; Schm. in li. H.	17 Op Ba Lo
B.H. 26 J. w.	<u>Destruktionsluxa-</u> <u>tion</u> re.	Sk der LWS	B-sch; H. re. 180/90	frei	Schm. bei längerem Gehen	ke
E.D. 16 J. w.	mit 5 Wochen <u>Hüft-</u> <u>osteomyelitis</u> re.	Hyper- lordose der LWS	H-steife re.	genu re- curvatum re.	schm.frei	23 sul chu Um Os
S.C. 16 J. w.	am re. Knie, li. O-schenkel, li.H., li.Handrücken, li. Hand gel., li. Wange <u>Säuglings-</u> <u>osteomyelitis</u>	Ausgl.- Sk der LWS	B-sch	Platt- füße bds.	schm.frei	se. mel Os mie
S.H. 14 J. w.	<u>Wachstumsstö-</u> <u>rungen</u> a.d. re. Tibia (prox. + dist.)	keine	B-sch	Klumpfuß re; genu varum li. genu val- gum re.	schm.frei	27. Ep des O-I Os

rühere pera- tionen	Bewegl.- keit i.K. praeop.	Op.Dat. cm vor cm verk.	G-i. nach ..Tg.	Bwg. i.K. n.Op.	Bel. nach ..Tg.	Entl. nach ..Tg.	M-E. nach ..Tg.	Wunde	Rö	Kompli- katio- nen
.5.62 btro- antäre t. re. .7.63 Bein-Ost .	frei	16.4.64 5 4 links Stufen	40	frei	56	61	351	pp.	fest	keine
.6.62 rrektur r Frak- rstelle	frei	20.5.63 5 4,5 links Stuf.Dr.	24	frei	38	42	-	pp.	fest	keine
.11.59 . nach yer- renz	frei	26.5.64 7 5 rechts V-Span	49	frei	53	65	-	pp.		keine
ine	frei	25.6.62 9,5 5 links V-Span	28	frei	32	78	396	pp.	fest	keine
.7.63 btro- antäre stellgs. t.	frei	13.6.64 8 5 links V-Span	30	180/ 100 nach 2 Mo- naten	39	59	-	pp.		keine
lt 1950 rere teoto- n	180/ 60 li. 160/ 100 re.	26.4.63 13/4 li; gleich- zeitige Verläng. re.(3cm) Subtroch. Laschennagel	29	-	264 für das re.	94	-	pp.	fest	starke H- + K- Kontrak- tur li.
.5.59 .physio- se li. Bein- . re.	frei	28.6.62 4,5/3 li. (U-schen- kel)dane- ben Platt- fußop. Schräg- Span	110	frei	114	122	418	pp.	fest	keine

Nr. Abb.	Name Alter Geschl.	Diagnose	WS	B u. H	Extremi- täten	Beschwer- den	
43	S.R. 17 J. m.	mit 16 J. <u>Polio</u> , Lähmung an bei- den Beinen, bes. am re.	Ausgleich- Sk.	H. re. pass. beweglich	am li. Bein Quadri- cepsschw.	schm.frei	24 Kr th se
44	K.I. 16 J. w.	mit 8 J. Fahrrad- unfall, <u>Wachstums-</u> <u>störung</u> infolge Verlötung der li. dist.Femirepiphyse	Ausgleich- Sk.	B-sch.	frei	schm.frei	ke
45	D.I. 29 J. w.	<u>Traumatische H-</u> <u>luxation</u> li.	keine	Bewegl. im li.H- gel.ein- geschränkt	Spitzfuß li.	schm.frei	5. V- 5. Pe Er li La
46	D.F. 18 J. m.	angeb. <u>H-dysplasie</u> bds.; fehlender Schenkelhals	leichte Sk. der LWS	B-sch.; Bewegl. bds. ein- geschränkt	frei	K-schm.	ke
47	B.Z. 10 J. w.	angeb. <u>H-luxation</u> bds.	keine	H-steife li.	Spreiz- fuß re., Hakenf. li., O- bein re. genu re- curvatum re.	schm.frei	19 Op ve re d.
48	Z.M. 21 J. w.	mit 6 J. <u>Polio</u> re.	Flach- rücken m.leich- ter Ky- phose d. LWS	B-schm.	Klump- fuß re; Lähmung re.Bein	schm.frei	22 La nu
49	R.M. 19 J. w.	mit 6 J. <u>Polio</u> re.	Ausgleich- Sk	B-schm.	Klump- fuß re; Lähmung re.Bein	schm.frei	19 su AL 27 K- Os
50	B.L. 37 J. w.	angeb. <u>H-luxation</u> bds.	keine	B-sch, Bewegl. bds.ein- geschränkt	frei	Scam. in li. H.	19 Dr 19 Kö 19 Ab

Operationen	Bewegl.- keit i.K. praep.	Op-Dat. cm vor cm verk.	G-A. nach ..Tg.	Bwg. i.K. n.Op.	Bel. nach ..Tg.	Entl. nach ..Tg.	M-E. nach ..Tg.	Wunde	Rö.	Kompli- katio- nen
10.62 ear- ode- re.	frei (pass.)	19.11.62 7 5 links V-Span	60	frei	62	66	-	pp.	fest	keine
ne	frei	12.5.60 7 5 rechts Schräg- Gialit- Span	39	frei	42	53	374	pp.	fest	Keine Einhei- lung d. Spanes. Muße entfernt werden.
5.57 ost.li. 5.57 onäus- satzop. (1963 ibri,li)	frei	30.4.63 4 4 rechts V-Span	22	frei	54	82	563	pp.	fest	keine
ne	frei	22.6.61 2,2 3 rechts V-Span	12	frei	30	40	-	pp.	fest	keine
9 rati- Ein- kung i.H.	frei	10.2.58 2 4 rechts V-Zah- radnicek	In 2. Sitzung nach 90 Tg. Extraktion d. Marknagels nach Rotationsosteotomie; Entlassung nach 201 Tg.; Kniebeweglichkeit frei					gerin- ge Wund- eite- rung	-	-
3.61 ibri- i re.	frei	27.1.64 9 6,3 links Stufen- Draht	25	frei	35	56	-	pp.	fest	2.2.65 Spanan- lagerung wegen Pseudo- arthrose!
6 otalare throdese 1.58 Bein- i. re.	frei	17.1.60 4,5 3 links V-Span	14	frei	35	75	730	pp.	fest	keine
46 h-Ost. 48 H- of-Res. 53 lukt.Ost.	180/ 60	2.12.63 5 3 links V-Stell- schraube- subtrochantär	58	180/ 70	65	-	-	pp.	fest	keine

2. Bildmaterial

zu Fall 18, Seite V




Abb. 1a. Angeborene Hüftluxation rechts vor
der operativen Hüfteinrenkung




Abb. 1b. Zustand nach der Verkürzungsosteotomie
rechts um 2 cm (3 Mon. nach der Operation)

zu Fall 21, Seite V




Abb. 2a. Unterschenkeldurchschuß
rechts; Beckenschiefstand
und Ausgleichskoliose



Abb. 2b. Zustand nach Verkür-
zungsosteotomie links
um 5,5 cm; Z-förmige
Osteotomie mit Span-
anlagerung und Draht-
umschlingung (8 Mon.
nach der Operation)

zu Fall 25, Seite VII



a)

b)

Abb. 3. Beinverkürzung links um 5 cm infolge Poliomyelitis; Zustand vor der Operation.

- a) ohne Ausgleich; Beckenschiefstand und statisch bedingte linkskonvexe Skoliose der LWS
- b) Ausgleich des Beckenschiefstandes durch Brettchenunterlage von 5 cm.



c)

Abb. 3c. Zustand nach der Verkürzungsosteotomie re um 3,5 cm.


Abb. 4a. Wachstums-
störungen an der
rechten Tibia prox.
u. dist.
Verkürzung um
4,5 cm re.



Abb. 4b.
Operationsbild.
Unterschenkel-
verkürzung von
3 cm! Schräge
Osteotomie mit
Spananlagerung
beiderseits



Abb. 4c. Zustand
vor der Nagel-
extraktion
(14 Mon. nach
der Operation)



zu Fall 45, Seite XIII



Abb. 5a. Zustand nach traumatischer Hüftluxation links; Beinverkürzung links von 4 cm




Abb. 5b. Zustand nach Verkürzung des rechten Beines um 4 cm (14 Monate nach der Operation)

Zu Fall 46, Seite XIII



Abb. 6a. Angeborene Hüftdysplasie beiderseits; Verkürzung des linken Beines von 3,5 cm Beckenschiefstand und leichte linkskonvexe Skoliose der LWS




Abb. 6b. Operationsbild; typische V-förmige Osteotomie mit Spananlage bds.



Abb. 6c. Zustand nach Resektion von 3 cm aus dem Femurschaft rechts (5,5 Monate nach der Operation). Gleichzeitiger Ausgleich der vorher bestandenen Antetorsion.

C) ERGEBNISSE und DISKUSSION

In der Orthopädischen Klinik München wurden vom Jahr 1955 ab 50 Verkürzungsosteotomien durchgeführt. Die Indikation zur Operation ist in den meisten Fällen wegen der bestehenden oder zu erwartenden irreversiblen statischen Veränderungen des Bewegungsapparates gegeben.





Fig. 1 Ursachen der Beinverkürzungen

Das günstigste Alter, in dem man eine Verkürzungsosteotomie durchführen sollte, liegt laut Fig. 1 zwischen 15 und 25 Jahren, d.h. in den Altersstufen, in denen

das Wachstum abzusehen oder bereits abgeschlossen ist. Sonderfälle sind die Patienten mit jeweils 7 Jahren. Hier zeigt es sich, daß angeborene Hüftluxationen, die sich den konservativen Behandlungsmethoden widersetzen, durch Verkürzungsosteotomie des erkrankten Beines einzurenken sind. Man sollte diese Operation möglichst früh durchführen, nämlich in einem Alter, in dem zu erwarten ist, daß sich Kopf und Pfanne, auch wenn unvollständig ausgebildet, durch das funktionelle Einspielen und die Beanspruchung noch anzupassen vermögen.



52 % aller Patienten kamen mit statisch bedingten Ausgleichsskoliosen. Ein genu recurvatum trat in 6 % aller Fälle auf. 31 Patienten waren schmerzfrei und unterzogen sich der Operation aus kosmetischen Gründen (Tabelle 1).

Tabelle 1 - Folgende Ursachen führten die Patienten zum Arzt:

Gesamtzahl	Kreuzschmerzen, Gelenkbeschwerden, anderweitige Beschwerden	Kosmet. Gründe
50	19	31
100 %	38 %	62 %

In 78 % der Fälle führten die schweren Veränderungen des statischen Bewegungsapparates dazu, daß sich die Patienten bereits anderen Operationen, wie z.B. Variations-, X- und O-Bein-Osteotomien usw. unterziehen mußten. Daraus ist zu ersehen, daß die Operationen zum Ausgleich von Beinlängendifferenzen häufig nur eine Etappe sind zur Wiederherstellung oder Besserung der Statik und Beweglichkeit.




Fig. 3 Übersicht über zusätzliche Veränderungen am Skelett





Fig. 4 Übersicht über Operationen, welche vor der Verkürzungsosteotomie durchgeführt wurden

Die durchschnittliche Beinlängendifferenz betrug 6,6 cm, wobei 2 cm die geringste und 16 cm die größte Differenz ausmachten. Die vorgenommenen Verkürzungen bewegten sich



zwischen 2 und 7 cm. Bei der Verkürzungsosteotomie muß soviel reseziert werden, daß der Erfolg im Verhältnis zu dem relativ großen Eingriff steht. Es hat also wenig Sinn, bei einer Beinlängendifferenz von z.B. 7 cm nur 3 cm zu resezieren: andererseits wird es bei zu großer Längendifferenz (Fall Nr. 6) unmöglich sein, die gesunde Seite um den gleichen Betrag zu verkürzen, d.h. einen vollständigen Ausgleich zu erzielen, da einmal der Tonus der Muskulatur dies nicht zuläßt, zum andern die Schaftverhältnisse des Femurs die Resektion eines solch großen Knochenstückes nicht erlauben. Zu erwägen wäre hier eine sog. kombinierte Osteotomie (M. LANGE), d.h. eine gleichzeitige Verlängerung des erkrankten Beines um die Länge des auf der anderen Seite resezierten Stückes, wie es bei Fall 41 mit Erfolg durchgeführt wurde.

Es ist auch zu bedenken, daß die Verkürzungsosteotomie ein Eingriff ist, der den Patienten verkleinert. Nach Befragung nahmen die Patienten jedoch, im Hinblick auf den zu erwartenden Erfolg, eine Verkleinerung ihrer Körpergröße gerne in Kauf. An dieser Stelle sei ein weiterer Sonderfall (Fall 42) erwähnt: der linke und rechte Femur hatten die gleiche Länge, so daß die Verkürzungsoperation an dem zu langen Unterschenkel vorgenommen werden mußte; diese Operation verhinderte es, daß die beiden Knie auf verschiedene Höhen zu stehen kamen.

Tabelle 2. Operationsergebnisse

Gesamt- zahl	Todes- fälle	Amputa- tionen	Wundheilung		Fistel- bildung	Sequester- bildung
			p.p.	p.s.		
50	-	-	48	2	3	1
100 %	-	-	96 %	4 %	6 %	2 %

Tabelle 2 Operationsergebnisse (Fortsetzung)

Gesamt- zahl	stark verzö- gerte Callus- bildung	Pseudoarthrosen Gesamt- operiert		Dauer bis zur Belastung der Osteotomie (in Tg.)		Gipsfi- xierung in Wochen	Marknagel- entfernung nach Mo- naten	Durchschnittlich stationärer Auf- enthalt in Tagen Fälle m. Palle o. Störungen Störung	
				Fälle m. Störung.	Fälle o. Störung.				
50	5	3	3	77,5 im Durchschnitt 63,4 Tagen	49,4	7 Kürzester Fall 49:2 Längster Fall 14:18	17 Kürzester Fall 24:6 Längster Fall 11:41	101,4 (34 Fäl- le) - im Durchschnitt 83,5 Tage	65,6 (13 Fäl- le) -
100 %	10%	6%	6%	-	-	-	-	-	-

Völlige Mißerfolge blieben aus. Nach Tabelle 2 verlief die Wundheilung ohne nennenswerte Störungen. Auftretende Infektionen (2 x) waren mit Antibiotica und Spüldrains zu beherrschen. Die Ursachen der verzögerten Callusbildung und des Auftretens von 3 Pseudoarthrosen, wie es in insgesamt 8 Fällen beobachtet wurde, lagen z.T. in mangelhafter Adaption der Osteotomieflächen (stufenförmige Osteotomie) begründet, zum anderen Teil in Anwendung eines zu dünnen Küntscher-Nagels. Dabei kam es einmal zum Bruch des Nagels. Die Konsolidierung der

Tabelle 4 - Beweglichkeit in Knie und Hüfte auf Seite
der durchzuführenden Operation praeoperativ

Gesamtzahl	Hüfte eingeschränkt	Knie eingeschränkt	Knie + Hüfte frei
50	4	2	47
100 %	8 %	4 %	94 %

Osteotomie erfolgte auch nach Einbringen eines stärkeren Marknagels in üblicher Weise. Die Gipsabnahme erfolgte im Durchschnitt nach 43 Tagen, wobei im günstigsten Fall nach 14 Tagen, im schlechtesten nach 125 Tagen die ersten Bewegungsübungen stattfinden konnten. Nach durchschnittlich 63 Tagen konnten die Patienten belasten. Der stationäre Aufenthalt betrug laut Tabelle 3 im Durchschnitt 83 Tage. Ein "Sudeck" war in keinem der Fälle zu beobachten.

Die Nachuntersuchung, die schriftlich mit Fragebogen durchgeführt wurde, zeigte laut Angaben der Patienten, daß die durchgeführten Verkürzungsosteotomien keine wesentlichen Beeinträchtigungen der Hüft- und Kniefunktionen und keine nennenswerten Komplikationen hinterließen.

Tabelle 5 - Nachuntersuchung

Gesamt- zahl d. Fälle	Nach- unter- suchte Fälle	Durchschn. Zeitdauer zwischen Op.tag u. Nachunter- suchgs-Tag	Beweglichkeit Hüftgelenk		Beweglichkeit Kniegelenk		Arbeits- fähigkeit	
			frei	eingeschränkt	frei	eingeschränkt	voll	eingeschr.
50	34	3 Jahre	30	4	26	8	27	4
100%	68%	Fall 13, 18, 50: 10 Monate; Fall 33: 8 Jahre	60%	8%	52%	16%	54%	8%

Fall 29, 30, 37, 39 liegen noch oder wieder stationär.

Über die Arbeitsfähigkeit der Fälle 18, 24, 32 läßt sich noch nichts aussagen, da die Patienten erst 8 bzw. 11 bzw. 13 Jahre alt sind.

Tabelle 6 - Nachuntersuchung (Fortsetzung)

Nachuntersucht wurden von 50 Pat.	Davon hatten Beschwerden praeoperativ	Davon waren postoperativ völlig be- schwerdefrei	Eine wesentl. Besserung der Schmerzen konnte nicht erzielt werden bei
34 Pat.	19 Pat.	17 Pat.	1 Pat. (Fall 3, 11)

Fall 11:

Die Patientin kam relativ spät zur Operation. Die sekundären Veränderungen waren bereits so weit fortgeschritten, daß eine wesentliche Besserung der Schmerzen nicht erzielt werden konnte.

Fall 3:

Es handelte sich um eine coxa vara rechts und um eine Verkürzung rechts von 7 cm. Es wurde zuerst eine Valgisierungsosteotomie rechts zur Normalisierung der Hüftgelenksstatik durchgeführt. 6 Wochen später, bevor noch eine exakte klinisch-funktionelle Feststellung der durch die Valgisierung eingetretenen Verlängerung möglich war, wurde das linke Bein um 6 cm verkürzt. Jetzt besteht eine Differenz von 2 cm zugunsten des rechten Beines. Daraus kann man die Schlußfolgerung ziehen, daß es bei kombinierten Eingriffen, die die Länge beider Beine betreffen, günstiger ist, die Operationen in größerem zeitlichen Abstand durchzuführen. Man muß erst den Erfolg und das Ausmaß des ersten Eingriffes voll beurteilen können, bevor man entscheidet, wann und wieviel reseziert werden soll.




Fig. 6 Übersicht über die verschiedenen Operationstechniken und deren Komplikationen

Die Resektion wurde nach verschiedenen Methoden durchgeführt. Am häufigsten fand dabei die V-förmige Osteotomie mit und ohne Spananlagerung Verwendung, wobei die angelegten Späne offensichtlich meistens keinen größeren Einfluß auf die knöcherne Konsolidierung nahmen. In 5 Fällen wurde bei dieser Methode eine verzögerte Callusbildung beobachtet, in 2 Fällen Pseudoarthrosen (6 %). Bei der stufenförmigen Osteotomie, meistens mit Spananlagerung und Drahtumschlingung durchgeführt, wurden 2 Fälle mit verzögerter Callusbildung und eine Pseudoarthrose festgestellt, d.h. bei 38 % der Fälle, welche mit dieser Methode operiert wurden, traten schwache Störungen bei der Knochenheilung auf. Bei der subtrochantären Osteotomie, welche in 5 Fällen ausgeführt wurde, waren keine Komplikationen festzustellen. Die schräge und die quere Osteotomie waren ein totaler Mißerfolg. Bei Betrachtung dieser Ergebnisse muß doch gesagt werden, daß die V-förmige Resektion und Verzahnung die größte Aussicht auf Erfolg in Hinsicht auf die schnelle und gute knöcherne Konsolidierung bietet. Ebenso ist die subtrochantäre Osteotomie mit Marknagelung oder Laschennagelfixierung eine gute Methode zur Operation von angeborenen Hüftluxationen. Abzulehnen ist die schräge und die quere Osteotomie wegen der Gefahr der schlechten Fixierung und der postoperativen Komplikationen. Leider gibt es noch kaum größere Untersuchungen anderer Autoren, welche einen Vergleich mit den hier angeführten Beobachtungen gestatten. THOMPSON, STRAUB und CAMPBELL berichteten 1954 von 51 Verkürzungsosteotomien, die im Zeitraum von 1938-1952 durchgeführt wurden. 40 Fälle wurden mit schräger Osteotomie und Schraubenfixation behandelt, bei 11 Fällen verwendete man die quere Osteotomie und Fixation mit KÜNTSCHER-nagel. In der 1. Gruppe waren 3 Nachoperationen notwendig, in der 2. Gruppe dagegen waren bei 11 Patienten

12 Nachoperationen erforderlich auf Grund von mangelhafter Fixation (Bruch, Verbiegung, schlechter Sitz des Nagels). In 4 Fällen wurde ein genu recurvatum festgestellt, in 1 Fall gab es eine Pseudoarthrose und ein weiterer Fall hatte einen Verlust der aktiven Streckung für 6 Monate. Auf Grund dieser Tatsachen lehnen THOMPSON et al. ebenfalls die quere Osteotomie ab. SLEE aus Hereford/England stellte eine Arbeit über die Verkürzungsosteotomie des Beines zusammen und konnte an Hand von 53 Fällen, welche von verschiedenen Chirurgen behandelt wurden, ähnliche Ergebnisse beschreiben. Inbegriffen sind dabei 19 Fälle von Tibiaverkürzungen. Es wurden dabei verschiedene Techniken angewandt, wobei die Schraubenfixation ebenfalls der Marknagelung nach KÜNTSCHER vorgezogen wurde. Die erreichten Verkürzungen betrugen 3,2 - 8,4 cm am Femur und 4,5 - 5 cm an der Tibia. Die Tonisierung der Muskulatur machte postoperativ keine Schwierigkeiten. Die Ergebnisse zeigten ebenfalls, daß die Verkürzungsosteotomie ein sicheres Operationsverfahren geworden ist.

D) ZUSAMMENFASSUNG

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um die statistische Erfassung und Auswertung der in der Orthopädischen Klinik München-Harlaching durchgeführten Verkürzungsosteotomien. Die Verkürzungsosteotomie ist keine lebensrettende, sondern eine das Leben erträglich gestaltende Operation. Sie nimmt sich die Erhaltung und die Wiederherstellung der normalen Statik, d.h. die Korrektur der vorhandenen oder zu erwartenden sekundären Veränderungen des Bewegungsapparates zum vornehmlichen Ziel. Sie ist hiermit auch eine prophylaktische Maßnahme. Dank der KUNTSCHER-Nagelung ist die Verwendung eines Beckenbeingipses auf verhältnismäßig kurze Zeit beschränkt, wodurch die Funktion der Hüft- und Kniegelenke sich rasch wieder normalisieren können. Die V-förmige Resektion und Verzahnung ist dabei bis jetzt die sicherste Methode. Die Betrachtung der Ergebnisse ergibt keinen Anhaltspunkt für eine negative Beurteilung, sondern es darf abschließend gesagt werden, daß die Verkürzungsosteotomie mit Hilfe der KUNTSCHER-Nagelung bei größeren Beinlängenunterschieden eine wirksame Operationsmethode geworden ist.

Die Arbeit wurde in der Orthopädischen
Klinik München (Direktor Prof. Dr. M. LANGE)
durchgeführt.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Priv.-Doz.
Dr. K. VIERNSTEIN für die Überlassung des
Themas und die jederzeit freundlich ge-
währte Hilfe.

F) LITERATURVERZEICHNIS

- 1) ALTAV, H.: Verkürzungsosteotomie, Zeitschr.
f. Orthop. Bd. 89, S. 83 / 1958.
- 2) BLOUNT, W.P., and
CLARKE, G.R.: J. Bone and Joint Surg. 31-A:
S. 464/ 1949.
- 3) BLOUNT, W.P.: Epiphysenwachstumsstörungen und
ihre Behandlung, Verh. orthop.
Ges. 1952, S. 197.
- 4) BÜHLER, J.: Verhütungen von Mißerfolgen bei
Verkürzungsosteotomien des Ober-
schenkels mit dem Marknagel.
Arch. orthop. Chir. 46:
436-438 (1954).
- 5) BÜHLER, L.: Technik der Knochenbruchbehand-
lung. Bd. II, Maudrich, Wien 1954.
- 6) CALVE, J., and
GAILLARD, M.: A New Procedure for Compensatory
Shortening of the Unaffected Femur
in cases of considerable Asymme-
trie of the Lower Limbs (Fractures
of the Femur, Coxalgia etc.).
Am. J. Orthop. Surg. 16:
211-235, April 1918.
- 7) CAMTERA, U.: 32 casi di accorciamento dell'arto
inferiore sano a scopo ortopedico:
indicazioni, tecnica, risultati,
Chir. d. Org. Movimento 17:
569-587/ 1933.
- 8) CANO, L.S.,
VALDES, E.: Losproblemas mecanicos y biologicos
del enclavijamiento medular de
Küntscher. Cirug. Apar. Locom. 2:
193 (1945)
- 9) DANIS, R.: Théorie et pratique de l'ostéo-
synthese. 12. Congr. Intern. Chir.
London 1947, Brüssel 1948.
- 10) DEJARDIN; zitiert bei G. Küntscher: Praxis
der Marknagelung, S. 9.

- 11) DEUTSCHLÄNDER, C.: Die Heine'sche Operation der Kontinuitätsverkürzung. Verh. deutsch. orthop. Ges. 6, S. 47/1907.
- 12) EHALT, W.: Das verkürzte Bein. Verh. deutsch. orthop. Ges., 47. Kongr. 1960, S. 451.
- 13) EHALT, W.: Behandlung der offenen Brüche der langen Röhrenknochen mit Ein-schluß der Behandlungsergebnisse. Maudrich - Wien 1938.
- 14) EISELSBERG, von: zit. bei P. GLAESSNER. Verh. orthop. Ges. 1907, S. 40.
- 15) EYRE & BROOK, A.L.: Bone-Shortening for Inequality of Leg Lengths. Brit. Med. J. 1951, S. 222 und S. 234.
- 16) FASSETT, F.J.: An Inquiry into the Practicability of Equalizing Unequal Legs by Operation. Am. J. Orthop. Surg. 16: 277-287, Sept. 1918.
- 17) FISCHER, A.W., REICH, H.: Wie steht es um die Gefahr der Osteomyelitis bei der Küntscher-Nagelung offener Frakturen? Zentralblatt f. Chir. 1943, S. 299.
- 18) GLAESSNER, P.: Die Kontinuitätsresektion der langen Röhrenknochen zur Aus-gleichung von Verkürzungen. Verh. orthop. Ges. 1907, S. 39.
- 19) GROSPIC, F., STARZYK: Wiederherstell.-Chir.-Traum. - Bd. 38
- 20) GROVES, E.W.: An Adress on Sutare and Poise: The problem of Unequal Legs. British. Med. I. 2: 1-5/ 1931.
- 21) HACKETHAL, K.H.: Warum auch noch Bündelnagelung? Der Chirurg, 1963, Heft 12. S. 550.

- 22) HAGBERG, N., LINDSTRÖM, Å.: Aspects of Epiphysiodesis. Act. orthop. scand. 1958, S. 69.
- 23) HOFFA, A.: Lehrbuch der orthopädischen Chirurgie. Stuttgart 1905. S. 863.
- 24) HOWORTH, M.B.: Leg-Shortening operation for Equalizing Leg Length. Arch. Surg. 44: 543-555/ 1942.
- 25) INGELRAUS, P., VENDEUVRE, A., Mlle. NIGOUL: Trois observations d'accourissement pour inégalité des membres inférieurs. Rev. d'Orthop. 34: 177-179/1948.
- 26) KÜNTSCHER, G., MAATZ, R.: Technik der Marknagelung, Thieme Vlg. Leipzig 1945.
- 27) KÜNTSCHER, G.: Die biologischen Gesetze der Knochenbruchheilung. Der Chirurg, 1961 Heft 6 und 7, S. 261 und S. 312.
- 28) KÜNTSCHER, G.: Die geschlossene Osteotomie der langen Röhrenknochen. Der Chirurg, 1962, Heft 6, S. 273.
- 29) KÜNTSCHER, G.: Mark-, Pinsel- und Bündelnagelung. Der Chirurg, 1963, Heft 3, S. 111.
- 30) KÜNTSCHER, G.: Praxis der Marknagelung. Stuttgart-Schattauer Vlg. 1962, S. 9.
- 31) LANGE, M.: Orthopädisch-chirurgische Operationslehre, I.F. Bergmann Vlg., München 1962/ S. 635.
- 32) LANGE, M.: Die operative Behandlung der mit starker Verkürzung oder Verkrümmung geheilten Oberschenkelbrüche. Verh. dtsh. orthop. Ges., 27. Kongr. 4, 492 (1932).
- 33) IANZ, T., Ritter von, WACHSMUTH, W.: Praktische Anatomie, 1. Bd. 4. Teil. Jul. Springer Vlg. Berlin 1938.

- 34) LEVEUF, J.: Results of Open Reduction of "True" Congenital Luxation of the Hip. I. Bone and Joint Surg. 30-A: 875-882/ 1948.
- 35) MAATZ, R.: Ergebnisse der Marknagelung (1939-1949). Springer-Vlg., Berlin 1951.
- 36) MC CARROLL, H.R.: Trials and Tribulations in Attempted Femorel Shortening. J. Bone and Joint Surg. 32-A: 133-142/ 1950.
- 37) MERKELBACH, F.: Verkürzungsoperationen an den unteren Extremitäten. Zeitschr. f. Orthop. 1949, Bd. 78, S. 396.
- 38) MOORE, I.R.: Tibial Lengthening an Femoral Shortening. Pennsylvania Med. I. 36: 751-755/ 1933.
- 39) MOORE, M.D.: Supra condylar Shortening of the Femur for Leg Length Inequality. Surg., Gynec., and Obstetr., 84: 1087-1094, 1947.
- 40) NES, van, C.P.: Ma technique actuelle de racourissement du femur sain pour inégalité longueur des membres inférieurs. Act. orthop. Belg. 1948/ S. 219.
- 41) OLLIER, L.: Traité des réséctions et des opérations conservatives qu'on peut pratiquer sur le système osseux. Bd. 2, S. 473. V. Masson, Paris 1888.
- 42) OMBREDANNE, L.: Sur les hutées ostéoplastiques de la hanche. Bull. Soc. Chir. Paris 53, 728 (1927).
- 43) PHALEN, G.S., CHATTERTON, C.C.: Equalizing the Loner Extremities. Clinical Consideration of Leg Lengthening versus Leg Shortening. Surgery 12: 768-781/ 1942.

- 44) PHEMISTER, D.B.: Operative Arrestement of Longitudinal Growth of Bones in the Treatment of Deformities. I. Bone and Joint Surg. 15: 1, 1933.
- 45) RAISCH, O.: Marknagelung bei frischen Oberschenkel-
schußbrüchen. Der Chirurg, 1943, Heft 15, S. 381.
- 46) REICH, H.: Die Infektion und Regeneration des frischen Knochenbruchs unter besonderer Berücksichtigung der Marknagelung nach Küntscher. Zeitschr. f. Orthop., 1948, Heft 77, S. 97.
- 47) RETTIG, H.: Frakturen im Kindesalter. I.F. Bergmann Vlg. München 1957.
- 48) RETTIG, H.: Untersuchungen über die Reaktionen des Organismus auf die Marknagelung. Med. Diss. München 1947.
- 49) ROTH, H.: Schweiz. Med. Wochenzeitschrift, Bd. 75, S. 7 (1945)
- 50) ROYLE, N.P.: The Treatment of Inequality of Length in the Lower Limbs. Med. I. Austral. 1: 716-718/ 1923.
- 51) SCHEDE, Fr.: zit. bei GLAESSNER, S. 39.
- 52) SENFF, A.: Die Gefahren der Fettembolie bei der Marknagelung nach Küntscher. Zentralblatt f. Chir. 1950, Heft 75, S. 339.
- 53) SLANY, A.: Marknagelung und Blutbild. Arch. Orthop. und Unfallchirurgie 1944. S. 131.
- 54) SLEE: J. of Bone and Joint Surg. Nov. 1964, S. 797.
- 55) SORONDO, I.,
PINEIRO: Acortamiento quirúrgico de un miembro inferior su técnica. Rev. Assm. Med. Argentina 62/ 73-77 (1948)

- 56) STOTZ, W.: Unsere Erfahrungen mit der Marknagelung nach Küntscher. Arch. Orthop. Chir. 1943, Heft 42, S. 392.
- 57) STRAUB, I.R.,
THOMPSON, T.C.,
WILSON, P.D.: The results of Epiphysiodesis and Femoral Shortening in Relation to Equalization of Lim Length. I. Bone and Joint Surg. 27: 254-266 (1945).
- 58) STREET, D.M.: One Hundred Fractures of the Femur Treated by Maens of the Diamond-Shaped Medullary Nail. I. Bone and Joint Surg. 33-A: 659-669 (1951).
- 59) STUCK, W.G.,
THOMPSON, M.S.: Complications of Intramedullary Fixation of Fracture of the Femur. Arch. Surg. 63: 675-686 (1951).
- 60) TITZE, A.: Erfahrungen bei der Korrektur jugendlicher Wachstumsstörungen. Zeitschr. f. Orthop. 1958, S. 88, Bd. 89.
- 61) THOMPSON, M.D.,
STRAUB, I.R.,
CAMPBELL, R.D.: An evolution of Femoral Shortening with Intramedullary Nailing. I. Bone and Joint Surg. 36-A: 43-56/1954.
- 62) WHITE, I.W.: Femoral Shortening for Equalization of Leg Length. I. Bone and Joint Surg. 17: 597-604/ 1935.
- 63) WHITE, I.W.: Overlapping Procedure for Shortening Bone Defects. Lectures on Reconstruction Surgery of the Extremities. Instructional Course Lectures. The American Academy of Orthop. Surgeons. 1944. Ann. Arber, I.W. EDWARDS, 1944.
- 64) WILSON, P.D.,
THOMPSON, T.C.: A clinical Consideration of the Methods of Equalizing Leg Length. Ann. Surg. 110: 942-1015/ 1939.

- 65) WITT, A.N.: Die operative Beseitigung größerer Beinlängendiskrepanzen. Monatszeitschr. f. Unfallheilkunde, Bd. 66, S. 438 (1963).
- 66) ZAHRADNICEK, I.: Beitrag zur Reposition der hohen angeborenen Hüftverrenkung. Arch. Klin. Chir. 180, S. 353 (1934).

L e b e n s l a u f

Ich, Wolfgang Gernet, wurde als 3. Kind des Ministerialrates August Wolfgang Gernet und dessen Ehefrau Irene Gernet, geb. Rieger, am 17.6.1940 in München geboren. Von 1946 - 1951 besuchte ich die Volksschule in München. Von 1951 - 1960 besuchte ich das Humanistische Theresien Gymnasium in München, das ich im Juni 1960 nach bestandener Reifeprüfung verließ.

Das Studium der Medizin begann ich im Wintersemester 1960 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Am 31.12.1961 starb mein Vater.

Im Sommer 1962 legte ich das Vorphysikum ab und bestand das Physikum im Sommer 1963. Dem Staatsexamen unterzog ich mich im Sommer 1966 in München und beendete es im Dezember 1966.

